

من يجب عليه اخذ اللقاح ومن لا يجب عليه أخذه هل كنت تعلم؟



هل هناك مجموعات من الأشخاص لا يجب عليهم تناول لقاح كوفيد - 19؟

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا:

لن يتم ترخيص اللقاح للاستخدام على الأطفال دون سن 16 عامًا لأنه لم يتم إجراء تجارب السلامة على هذه المجموعة. سيتم النظر في الأطفال الذين يعانون من حالات طبية تعرضهم لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات كوفيد - 19 بعد البدء الأولي للقاح عند توفر المزيد من الأدلة.

الحامل والمرضع:

كما هو معتاد في التجارب الأولية للتلقيح، لم يتم اختبار لقاح كوفيد - 19 على وجه التحديد لدى النساء الحوامل والمرضعات. لا يوجد حاليًا دليل كافٍ للتوصية بأن تتلقى جميع النساء الحوامل هذا اللقاح بشكل روتيني لأن الدراسات لا تزال جارية للتحقيق في آثار اللقاح على الحمل في الحيوانات.

ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة للتلقيح قد تكون مهمة بشكل خاص لبعض النساء الحوامل اللاتي لديهن مخاطر عالية للإصابة بمضاعفات خطيرة من كوفيد - 19 أو أولئك الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة كوفيد - 19. يُنصح هؤلاء النساء بمناقشة الأمر مع الطبيب وقد يقررن تلقي اللقاح.

يُنصح النساء الحوامل غير المعرضات لخطر الإصابة بالكوفيد - 19 اللواتي لا يعانين من مضاعفات خطيرة من كوفيد - 19 بتأجيل التطعيم حتى انتهاء الحمل.

فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، لا توجد بيانات أمان متاحة فيما يتعلق باللقاح أثناء الرضاعة الطبيعية أو عند الرضاعة الطبيعية. على الرغم من ذلك لا يُعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضيع الذي يرضع. قد تقرر النساء المرضعات تلقي التطعيم، أو قد يختارنا تأجيل التطعيم حتى ينتهين من إرضاع أطفالهن.

هل هناك حالات يجب فيها تأجيل أخذ اللقاح؟

- إذا كنت مريضًا جدًا، يجب عليك تأجيل تلقي اللقاح حتى تتعافى. تأكد من إبلاغ خط المساعدة الخاص بالتطعيم الكوفيد - 19 على الرقم 145
- إذا لم تتمكن من حضور موعد التطعيم الخاص بك. هذا حتى يتم منحك موعدًا آخر ولن تضيع وقتك.
- إذا كنت مريضًا بشكل طفيف ولا تعاني من الحمى أو أعراض أخرى مثل القشعريرة أو الغثبان أو القيء أو الإسهال، فلا داعي لتأجيل تلقي التطعيم.
- إذا كنت تعاني من أي أعراض مرتبطة بـ كوفيد - 19 (حمى، سعال، ضيق في التنفس، تعب، احتقان في الحلق، سيلان / انسداد الأنف، صداع، ألم عضلي، فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة التذوق، إسهال أو قيء) يُنصح بالاتصال بالرقم 111 لترتيب اختبار المسحة والحصول على مزيد من النصائح. من فضلك لا تحضر للتلقيح إذا كانت لديك أعراض كوفيد - 19 محتملة أو إذا كانت نتيجة فحص المسحة الخاصة بك لم تظهر بعد.
- إذا كان تحليل كوفيد - 19 الخاص بك إيجابيًا ، فيجب عليك تأجيل تلقي اللقاح حتى تتعافى لمدة أربعة أسابيع على الأقل من بداية ظهور الأعراض.

ينصح بمن يلي التحدث مع الطبيب قبل أخذ لقاح كوفيد - 19

- إذا كنت تتناول دواء مضاد لتخثر الدم
- إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف أو ضعف الصفائح الدموية.
- يتم تشجيع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يتناولون الأدوية التي تثبط جهاز المناعة على أخذ اللقاح ولكن يجب التحدث إلى المتخصصين لإرشادهم في الوقت المناسب لتلقي اللقاح.

هل يجب أن يتلقى اللقاح الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في الماضي؟

لا توجد معلومات دقيقة حول مدة استمرار المناعة من العدوى الطبيعية. لذلك ينصح كل من تعافى من عدوى كوفيد-19 بأخذ اللقاح.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مالطا ليس المصدر الرسمي لهذه المعلومات. قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مالطا بترجمة هذه المعلومات لإتاحتها لك باللغة التي تفهمها، ولمشاركتها بين اللاجئين وطالبي اللجوء في مالطا

لمزيد من المعلومات المترجمة عن اللقاح كوفيد-19
يرجى زيارة

<https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta>.

المصدر: إدارة تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، مالطا
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

<https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/vaccines.aspx>

يتم تحديث هذا الموقع بانتظام حسب الحاجة.